

¡Feliz día mamis!

Trabajo científico

Hipergammaglobulinemia:
su relación con distintos
estados clínico-patológicos
y el rol del laboratorio



9 de Julio 1085 - Córdoba - CP 5.000

www.bioquimicoscba.com.ar - Tel. 0351 4245330 - 4232153



Buscanos en Facebook



**Nuestra nueva planta elaboradora.
1300 metros cuadrados, para seguir
produciendo productos de calidad
y eficiencia.**



SUPERANDO BARRERAS

Dra. Videla Isabel



Superar barreras es el desafío propio de la gestión y en eso llevamos experiencia. Algunas veces altamente satisfactorias, otras trabajosas y enrevesadas que invitan a poner de manifiesto la capacidad y voluntad de cumplir con el mandato con el nivel de eficacia y confianza que los asociados han depositado en nosotros.

Crecemos y nos desarrollamos cuando las barreras a superar están afuera, nos estancamos cuando las barreras están adentro. Estas, son más difíciles de reconocer y su enfoque y resolución es mucho más trabajoso.

En este mensaje queremos poner en evidencia dos cosas, nuestro compromiso absoluto de gestionar con total apego a las leyes y con la energía renovada que la nueva comisión expone desde el principio de su mandato.

Vale poner en evidencia que el tradicional apego a leyes y normas de gestión nos han hecho superar las desagradables, molestas e incomprensibles situaciones, de público conocimiento, que insistimos, ante nuestro permanente y total respeto a reglamentaciones vigentes las hemos superado con holgura, tal cual fuera puesto de manifiesto en forma destacada por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas- IPJ-

Ponemos en conocimiento de los Colegas que la Institución ha sido perjudicada en el aspecto económico, por el accionar malintencionado de una asociada, quién obviamente renunció como socia, al ver que IPJ rechazó sus denuncias por improcedentes e infunda-

das.

Así comenzamos una nueva etapa, que nos encuentra trabajando para pronto poner a su consideración nuevos servicios y propuestas para mejorar nuestras oportunidades de desarrollo profesional.

El pasado 26 de septiembre se desarrolló la Asamblea Ordinaria donde fueron aprobadas por unanimidad la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Balance correspondiente al Ejercicio Económico N° 57, cerrado el 31 de mayo de 2025.

Es de obligada nobleza agradecer el apoyo recibido de la gran mayoría de la comunidad bioquímica de nuestra institución, en los momentos difíciles que ya superamos.

MUCHAS GRACIAS.

SUMARIO

Editorial.....	1
Sumario.....	2
Novedades.....	3
SEPARATA	
HIPERGAMMAGLOBULINEMIA: SU RELACIÓN CON DISTINTOS ESTADOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS Y EL ROL DEL LABORATORIO	4

“AVANCE Y CAMBIO BIOQUÍMICO”
 AUTORIDADES PERÍODO 2025-2028

Comisión Directiva	
PRESIDENTE:	Dra. VIDELA, D. Isabel M.P.: 1289
SECRETARIA:	Dra. ARGUELLO, Elizabeth M. C. M.P.:289
TESORERO:	Dra. ALVAREZ, Susana V. M.P.: 2983
VOCAL TITULAR 1º:	Dr. VARELA, Claudio M.P.: 5060
VOCAL TITULAR 2º:	Dr. BARALE, Edgar R. M.P.: 4036
VOCAL SUPLENTE 1º:	MARZANO, Gabriela N. M.P.:1708
VOCAL SUPLENTE 2º:	MARUCCO, Mercedes M.P.: 2396

Tribunal de Honor	
Miembros Titulares:	Dr. MARTÍNEZ, Juan E. M.P.: 3095 Dra. NAHRA, Marta M.P.: 612 Dr. OVEJERO, Gustavo A. M.P.: 2923
Miembros Suplentes:	Dra. CARMONA, Alicia B. M.P.2164 Dr. GONZÁLEZ, Luis E. M.P.: 2032 Dra. YUDOWSKI, Silvia M.P.: 1900

Comisión Revisora de Cuentas	
Miembros Titulares:	Dr. ZARAZAGA, Gustavo M.P.: 2866 Dra. BRITOS, Fabiana C. M.P.: 2844 Dr. BARRERA, Aldo Luis M.P.: 2800
Miembros Suplentes:	Dr. POLACOV, Carlos. M.P.: 2816 Dra. RUIS de LOBBIA Ana M. M.P.: 1035

Asociación de
 Bioquímicos de
 Córdoba

Personería Jurídica N°344 "A"
 Decreto N° 9647

Presencia Bioquímica es un
 medio de difusión propiedad
 de la Asociación de Bioquími-
 cos de Córdoba

Director general
 Dra. Videla Dora Isabel

Director ejecutivo
 Dr. Gustavo Ovejero

Director administrativo
 Dra. Susana Alvarez

Comité científico
 Dra. Balseiro María Isabel †
 Dr. Bocco José Luis
 Dra. Massa María Angélica
 Dr. Moretti Edgardo
 Dra. Romero Marta
 Dra. Salgado Susana
 Dr. Gennero Daniel
 Dra. Basso Beatriz
 Dr. Juan Martínez

Redacción y administración
 9 de Julio 1085
 Tel. 0351 4232153
 CP 5000
 Córdoba
 e-mail: abioc@fibertel.com.ar

Presencia Bioquímica, es una
 publicación de distribución
 gratuita.
 Los artículos firmados son de
 exclusiva responsabilidad del
 autor. El material publicado
 puede ser reproducido sin
 autorización, citando la fuente.
 Registro de propiedad
 intelectual
 N° 14796738 IF-2020
 ISSN 0326-0070

Novedades

NUEVOS BENEFICIOS PARA SOCIOS



HOTEL CRUZ CHICA: Beneficios según convenio temporada alta y/o baja. Consultar.

ÓPTICA SOLER 30% de descuento en armazones, 30% de descuento en cristales oftálmicos acorde a receta médica. Descuento no acumulable con otras promociones.

MAIPÚ AUTOMOTORES: Beneficios según convenio. Consultar.

GRUPO 525 HOTEL BUENOS AIRES: Hotel Sheltown – Hotel Impala- Embajador Hotel <http://www.hotelshetown.com.ar/> Tarifa diferencial para socios de la ABC. DEPORBAS

GIMNASIOS-AQUALIFE: Descuento del 15% y bonificación en inscripción anual. www.deporbas.com.ar

POSADA "LOS ÁLAMOS": Merlo (San Luis): Descuento 20% en temporada baja. 10% en temporada alta y fines de semana largos.

Para más información comunicarse con Secretaría de la ABC.

SOCIOS DE ABC



Les recordamos que continúa vigente el servicio de débito automático de Tarjeta Naranja para los pagos mensuales de Cuota Social, Casa del Bioquímico, Seguro de Mala Praxis. Para compras en Proveeduría debe consultar por mail: proveeduriaabc@fibertel.com.ar o al Tel.: 4257077.

NORMATIVA COBICO PARA PUBLICITAR

Según normativas del Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de Córdoba "TODA" publicidad de los colegiados debe contener los siguientes datos:
Apellido y Nombre
Profesión M.P
Autorización del CoBiCo
Número de Aprobación de la publicidad.

**RESPETEMOS
LA NORMATIVA.**

REVISIÓN

Hipergammaglobulinemia: su relación con distintos estados clínico-patológicos y el rol del laboratorio

Castellano, Lucia¹ 

¹Laboratorio Central, Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina.

*Contacto: Castellano, Lucia. Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, Bajada Pucara 787, Paraná 550, Nueva Córdoba, C.P.500 O. Córdoba, Argentina; luciacastellano3@gmail.com

Resumen

Introducción: La hipergammaglobulinemia es el aumento en la producción de inmunoglobulinas por linfocitos B en respuesta a distintos estímulos. Se asocia a varios estados clínico-patológicos. **Objetivo:** Describir la utilidad de la detección de la hipergammaglobulinemia, su relación con distintos estados clínico-patológicos y el rol del laboratorio. **Materiales y métodos:** Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed y Google Académico. **Desarrollo:** Para detectar la hipergammaglobulinemia, se realizan distintas técnicas, como la electroforesis de proteínas para un análisis cualitativo, de las inmunoglobulinas que migran en el sector gamma, la inmunofijación o inmunoelectroforesis para clasificarla en monoclonal o policlonal y técnicas cuantitativas para determinar concentraciones de las distintas clases. La hipergammaglobulinemia policlonal se presenta en infecciones virales crónicas, patologías autoinmunes y errores innatos de la inmunidad, mientras que la monoclonal se asocia a neoplasias malignas. **Conclusión:** Mediante distintas técnicas de laboratorio, se puede identificar la hipergammaglobulinemia y, gracias a esto, contribuir al diagnóstico del paciente y a la diferenciación de otros estados clínicos patológicos.

Palabras clave: hipergammaglobulinemia, proteinograma por electroforesis, inmunoglobulinas, gammapatía monoclonal, gammapatía policlonal, inmunofijación.

Experiencia en la calidad...



L A B O R A T O R I O
MASSA - SILEONI

INDEPENDENCIA 644 PB - Tel (0351) 4212928/ 4250141
CORDOBA X5000- Mail: labmassasileoni@fibertel.com.ar

Introducción

Las inmunoglobulinas (Igs), constituyentes del suero, se generan a partir de la activación y diferenciación de linfocitos B (LB) tras la exposición a antígenos^{1,2}. Existen cinco clases: IgG, IgA, IgM, IgE e IgD, cada una con funciones específicas en la respuesta inmune¹⁻³. La hipergammaglobulinemia (HGG) resulta de la sobreproducción de Igs en respuesta a estímulos, ya sean infecciosos, autoinmunes o neoplásicos^{4,5}.

El perfil densitométrico del proteinograma por electroforesis (Pxé) puede revelar la presencia de HGG y clasificarla como policlonal o monoclonal, según la morfología del pico observado en la región gamma, comigrando en beta-1, beta-2, alfa-2; o, entre las fracciones. La presencia de una zona heterogénea, ancha y difusa en la zona gamma del Pxé sugiere una HGG policlonal (Figura 1) debido a la expansión de diversos clones de LB, asociada a causas reactivas, autoinmunes o errores innatos de la inmunidad. La presencia, en cambio, de una banda homogénea, alta, densa y delgada, en las regiones alfa, beta o gamma del Pxé corresponde a una HGG monoclonal (Figura 2). Este hallazgo orienta hacia una gammapatía monoclonal (GM), caracterizada por la proliferación de un solo clon de LB, que requiere estudios adicionales como inmunofijación, cuantificación de cadenas livianas libres y punción de médula ósea (MO) para la evaluación de la clonalidad^{3,5-7}.

Los objetivos de este estudio fueron describir la utilidad de la hipergammaglobulinemia para el diagnóstico de distintos estados clínico-patológicos y destacar el rol del laboratorio para identificar la hipergammaglobulinemia mediante distintas técnicas.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de revisión bibliográfica a partir de la búsqueda, selección y análisis de artículos científicos. Se llevaron a cabo búsquedas en la base de datos MEDLINE a través de su buscador PubMed y en el buscador Google académico. Se utilizaron los términos: *hipergammaglobulinemia, gammapatías monoclonales, proteinograma por electroforesis, maduración del sistema inmune, técnicas para determinar inmunoglobulinas, técnicas del laboratorio de inmunología, hipergammaglobulinemia en infecciones virales, hipergammaglobulinemia en neoplasias malignas*.

Se seleccionaron publicaciones de los últimos diez años y publicaciones más antiguas a las que se hace referencia habitualmente y que gozan de gran prestigio.

Se incluyeron todo tipo de artículos: trabajos de investigación, revisiones, capítulos de libros, recomendaciones y protocolos de laboratorio, etc.. Dentro de estos, se seleccionaron aquellos de revistas con mayor impacto científico, de autores reconocidos, con información actualizada y de calidad con respecto al tema investigado.

Se excluyeron artículos de bajo impacto científico, trabajos de investigación con tamaños muestrales pequeños, autores o centros con menor experiencia en el tema.

Desarrollo

Maduración del sistema inmune y producción de gammaglobulinas

La producción de inmunoglobulinas está vinculada a la maduración del sistema inmune desde el nacimiento hasta la adolescencia y se refleja en la variación de valores de los distintos isotipos de Igs. Conocer los valores de referencia de Igs según la edad es crucial para identificar la HGG⁹.

Los LB productores de inmunoglobulinas provienen de las células precursoras del sistema hematopoyético, maduran en MO y se diferencian a células plasmáticas (CP) en tejidos secundarios⁹.

Ontogénicamente, se producen múltiples cambios en los niveles de Igs desde el nacimiento hasta los ocho o diez años, en donde se estabilizan y alcanzan los valores de Igs del adulto^{2,9,10}.

El recién nacido tiene un número elevado de LB, pero mínima diferenciación de CP. Por este motivo, el nivel de todas las Igs es bajo, excepto IgG gracias al paso transplacentario. Conforme pasan los primeros meses de vida, los niveles de IgG disminuyen en forma progresiva creando un bache inmunológico hasta los 6 meses, momento en el cual comienza a sintetizar IgG^{2,9,10}.

La IgM, única Ig sintetizada por los neonatos normalmente, aumenta rápidamente después del primer mes de vida como respuesta a la colonización intestinal¹⁰.

La IgA, inicialmente deficiente en el epitelio mucoso intestinal fetal, aumenta en recién nacidos por el aporte del calostro y la leche materna¹⁰. Ver valores de referencia en Tabla I.

Metodologías para la detección de hipergammaglobulinemia

Las alteraciones cualitativas o cuantitativas de las inmunoglobulinas forman parte del cuadro clínico de numerosas enfermedades. En este sentido, resalta la importancia de cuantificarlas mediante diferentes metodologías⁷.

Electroforesis de proteínas

Esta técnica consiste en la migración de las proteínas del suero a través de un gel (o matriz porosa) en el cual, por

Tabla I. Valores de referencia de los distintos tipos de inmunoglobulinas según la edad.

	IgG (mg/dl)	IgA (mg/dl)	IgM (mg/dl)
RN (término)	610-1.500	1-4	6-30
3 meses	170-560	5-50	30-100
6 meses	200-670	8-70	30-100
1 año	330-1.160	10-100	40-170
2-6 años	400-1.100	10-160	50-180
7-12 años	600-1.230	30-200	50-200
Adultos	680-1.530	66-400	36-260

□ Fuente: Jolliff CR, Lost KM, Stirvinis PC, Grossman PP, Nolte CR, Franco SM, et al. Reference intervals for serum IgG, IgA, IgM, C3 and C4 as determined by rate nephelometry Clinical Chemistry. 1982;28:126-8. Metodología: nefelometría.

Figura 1. Pico policlonal.





Figura 2. Pico monoclonal.



acción de un campo eléctrico, serán separadas de acuerdo con su carga eléctrica y peso molecular. De esta manera, se obtienen 5 bandas proteicas: albúmina, alfa globulinas de tipo 1 y 2, beta globulinas de tipo 1 y 2 y la zona de las gammaglobulinas. También permite calcular la concentración de cada una respecto de la concentración de proteínas totales^{11,12}.

La electroforesis puede realizarse en soporte sólido donde, luego de la separación, se tiñen con colorantes y se cuantifican las fracciones por medio de un densitómetro^{12,14}.

Por otro lado, en la electroforesis capilar, se realiza la separación de proteínas en un capilar, donde, por la aplicación de un campo eléctrico, se produce un flujo electroosmótico que excede la movilidad electroforética por lo que las proteínas migran. Luego de la separación, se usan distintos detectores para cuantificar las proteínas. Al comparar este método con la electroforesis de proteínas en soporte sólido, se observa que posee varias ventajas: elevada resolución, mayor reproducibilidad, precisión y sensibilidad, automatización, rapidez, menores volúmenes de muestra y bajo costo^{12,13}.

La electroforesis de orina concentrada se usa para detectar la eliminación urinaria de cadenas livianas libres monoclonales (CLLM); estas son fragmentos de Igs que se exponen cuando no están unidas, por lo que se las denomina *libres*. La eliminación urinaria se denomina *proteinuria de Bence Jones*, y está presente en GM. Esta técnica aporta información sobre el índice de masa tumoral y permite su monitorización⁷.

Inmunofijación

Consiste en realizar la separación de las proteínas me-

diante una electroforesis de suero en carriles diferentes. Luego, se siembran antisueros específicos contra IgG, IgA, IgM, kappa y lambda que precipitan con la proteína y, después, se tiñen con un colorante específico para revelar las bandas reconocidas^{7,11,13,14}. Esta técnica es sencilla, rápida, sensible, clara y fácilmente interpretable por lo que prácticamente sustituyó a la inmunolectroforesis^{2,13}.

Se utiliza principalmente para GM, ya que permite caracterizar el tipo de cadena pesada y liviana que compone la paraproteína. Sin embargo, no permite cuantificar la HGG. Se realiza en suero y, además, en orina concentrada, ya que es más sensible y específica que otros ensayos más antiguos de Bence Jones^{2,7,11}.

Nefelometría y turbidimetría

Esta metodología se basa en agregar a la muestra de suero un exceso del anticuerpo (Ac) específico contra las Igs que se quieren determinar. Se forman agregados que dan turbidez y luego, un precipitado que dispersa la luz^{13,15}.

En la turbidimetría, el detector mide el descenso de la luz transmitida por la dispersión por las partículas, mientras que, en la nefelometría, se mide la luz dispersada^{11,13}.

Estas técnicas permiten cuantificar la proteína de manera rápida y automatizada. Sin embargo, como desventaja, pueden existir interferencias por turbidez de la muestra^{7,14,15}.

Por otro lado, dichas técnicas se utilizan para medir CLLM en casos de HGG monoclonal en suero y orina mediante Acs contra estas. Se calcula la razón K/I: un índice alterado orienta a una producción clonal de CLLM¹¹.

Se usan para diagnóstico (Dco.) y seguimiento de pacientes con enfermedad renal con gammopatías¹¹.

Quimioluminiscencia

Estos tipos de ensayos se utilizan para la detección de IgE debido a su alta sensibilidad, que permite su cuantificación, ya que la misma se encuentra en concentraciones muy bajas en suero¹⁵.

En los inmunoensayos quimioluminiscentes, se emplean moléculas que reaccionan químicamente con un sustrato generando un intermediario en estado excitado, que luego vuelve a su estado basal emitiendo luz. La cantidad de luz producida es directamente proporcional a la cantidad de analito presente en la muestra y se determina mediante una curva de calibración a partir de estándares de concentración de Ac conocida^{3,13}.

Esta técnica posee ventajas con respecto a otras técnicas de detección como: uso de etiquetas no isotópicas, sensibilidad mejorada, rapidez, rango de medición más amplio, aplicabilidad a distintos analitos^{3,13}.

Inmunodifusión radial simple

En una matriz de gel de agarosa con antisuero monoespecífico contra la proteína a determinar, distribuido de manera uniforme, el antígeno (Ag) se difunde libremente, de manera radial, hasta alcanzar la concentración de Ag-Ac adecuada, precipitando en forma de anillo. El cuadrado del diámetro del anillo de precipitación es directamente proporcional a la concentración de Ag. De esta manera, esta técnica permite cuantificar IgG, IgA e IgM mediante una curva de calibración con patrones de concentración conocida para cada Ag^{13,15}.

En la actualidad, ha sido desplazada por otras técnicas debido a que la precipitación completa lleva un tiempo mayor (de 24 a 48 h de difusión en cámara húmeda), y, si existen Igs poliméricas o incompletas, se formarán diferentes halos de precipitación según su peso molecular, que pueden inducir a resultados erróneos^{13,15}.

Inmunolectroforesis

Esta técnica permite la separación de las Igs en un gel de agar, de acuerdo con la densidad de cargas eléctricas, por exposición a una diferencia de potencial. Luego reaccionan con un antisuero general o específico en una canaleta. Se produce la reacción Ag-Ac, que se visualiza mediante arcos de precipitación que se deben comparar con un patrón conocido^{2,13,14}.

Esta técnica fue reemplazada por la inmunofijación para detectar Igs monoclonales, ya que es poco sensible, lleva un tiempo de 24 h de difusión en cámara húmeda y resulta difícil de interpretar debido a la dificultad para observar la pérdida de asimetría y grosor de las bandas^{2,7,14}.

Causas de hipergammaglobulinemia policlonal

Reactivas

La HGG policlonal está presente principalmente en infecciones crónicas por virus con gran replicación, persistencia, latencia y con tropismo por células linfoides. Se cree que las diversas especificidades de IgG provocadas por la infección

viral resultan del cambio de clase de IgM producida en el repertorio natural de LB¹⁶.

La familia de los *Herpesviridae* corresponde a este tipo de virus e incluye el citomegalovirus (CMV), el virus del herpes simple (HSV) y el de Epstein Barr (VEB). Estos virus son contraídos principalmente durante la infancia y son prevalentes en pacientes inmunodeprimidos con cuadros clínicos más graves^{17,18}.

Virus del herpes simple

El HSV causa infecciones líticas en la mayoría de las células, persistentes en linfocitos y monocitos e infecciones latentes en neuronas¹⁷. Durante la infección herpética, se desarrolla una respuesta humoral dirigida contra las distintas glicoproteínas de envoltura del virus; de esta manera, se produce la HGG policlonal¹⁹.

Virus de Epstein Barr

El VEB es el agente etiológico causante de la mononucleosis infecciosa. Este virus tiene un fuerte tropismo por LB, se acumula en los ganglios linfáticos y persiste en estado latente. Por otro lado, se activan células T en respuesta a los LB infectados para controlar su proliferación^{3,20}. Durante la etapa aguda de la enfermedad se generan diversos Acs inespecíficos transitorios que provocan HGG policlonal debido a la gran proliferación policlonal de LB y la escasa respuesta celular del huésped de esta fase. Luego, se producen Acs específicos contra distintas proteínas virales que sirven como marcadores del estadio de la infección^{3,4,20}.

Por último, la HGG es estimulada por la producción de un homólogo de la interleuquina IL-10 por acción del VEB. Este estimula la maduración de los LB y la producción de Acs¹⁴.

Citomegalovirus

El CMV infecta células epiteliales y puede permanecer latente en monocitos y linfocitos. La primoinfección por CMV es subclínica y, en ocasiones, similar a la mononucleosis por EBV^{14,17,20}.

La respuesta de Acs contra distintas proteínas del virión lleva a una HGG policlonal, sin embargo, los Acs neutralizantes tipo IgM e IgG se dirigen principalmente a las glucoproteínas de la cubierta.¹⁴

Autoinmunes

Dentro de las patologías autoinmunes, la hepatitis autoinmune (HAI), el síndrome de Sjögren (SSj) y el lupus eritematoso sistémico (LES) son las que cursan en mayor medida con HGG debido a que existe una pérdida de tolerancia a autoantígenos; esto produce la hiperactivación de LB y, sumado a la influencia de citocinas proinflamatorias como BAFF e IL-6, se da la hiperproducción de IgG, principalmente^{8,21}.

Hepatitis autoinmune

Es una enfermedad hepática inflamatoria crónica que se produce por una respuesta inmunitaria a patógenos exógenos que reaccionan de forma cruzada con autoantígenos

hepáticos similares^{22,23}. En consecuencia, se activan los LB y hay una hiperproducción de Igs, donde se eleva la IgG principalmente con un patrón de puente *b-g* en un PxE, acompañado de un ligero aumento de IgM^{22,23}. Por otro lado, se activan LT, que atacan el parénquima hepático y contribuyen a una inflamación progresiva crónica²⁴.

En conclusión, la HAI se presenta con HGG policlonal, que es característica de esta patología, lo que permite diferenciar entre un Dco. definitivo y probable de HAI, ya que, a mayores niveles de IgG, existen más chances de presentar HAI²⁴. Además, a la HGG dos veces mayor que el límite superior de referencia se la considera como un factor de mal pronóstico y se la asocia con mortalidad del 90% a los 10 años sin tratamiento²³.

Síndrome de Sjögren

Es una enfermedad que se presenta con infiltración linfoplasmocitaria de las glándulas de secreción exocrina causando sequedad, dolor y fatiga^{25,26}.

Se presentan autoantígenos por las células epiteliales de las glándulas, y se desencadena una respuesta inmune e hiperactividad policlonal de LB con producción aumentada de Acs principalmente tipo IgG²⁶.

Esta HGG policlonal se relaciona con una mayor prevalencia de manifestaciones extraglandulares. Además, se asocia con pruebas diagnósticas positivas como gammagrafía parotídea y biopsia de glándula salival y, por último, con la presencia de Acs antinucleocitoplasmáticos (ANA), antiantígenos extraíbles del núcleo (ENA) y factor reumatoideo (FR)²⁶.

Lupus eritematoso sistémico

Es una enfermedad autoinmune crónica, multisistémica y compleja con gran heterogeneidad en su presentación clínica y pronóstico^{27,28}. Su fisiopatogenia está dada por una disregulación de la muerte celular por apoptosis; de este modo, se liberan a la circulación autoantígenos modificados y se produce una respuesta inmune específica donde LB autorreactivos generan gran cantidad de Acs causando HGG de tipo policlonal con predominio de IgG^{27,28}.

Esta HGG está relacionada con la diversidad de clases y subtipos de Igs autoinmunes presentes. Dentro de estos, se encuentran los ANA, Acs antiribosomal P, FR, y, en menor medida, Acs antifosfolípidos²⁷.

Errores innatos de inmunidad

Se los define como estados patológicos en los que existe un defecto en algún componente del sistema inmune. Suelen manifestarse en los primeros años de vida con infecciones crónicas o recurrentes²⁹.

Síndrome de hiper IgM

Esta patología es causada por la incapacidad de los LB para completar su activación, maduración y diferenciación para ser CP productoras de Acs³⁰. Debido a distintas mutaciones, se produce un defecto en la ruta CD40L-CD40 o en

las enzimas necesarias para la hipermutación somática y cambio de isotipo. Por lo tanto, estos pacientes presentan niveles disminuidos de IgG, IgE, IgA y niveles normales o elevados de IgM, que provocan HGG policlonal^{30,31}. De esta forma, se ve afectada tanto la inmunidad humoral como la celular debido a la cooperación T-B defectuosa. Además, la respuesta de IgM es defectuosa contra distintos agentes infecciosos, lo cual lleva a mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y gastrointestinales³².

Síndrome de hiper IgE

Se trata de una patología caracterizada por niveles muy elevados de IgE, dermatitis eczematoide, infecciones recurrentes de piel y pulmón y formación de abscesos^{33,34}. Puede producirse por mutaciones en distintos genes que condicionan un déficit en la generación de células Th17 a partir de células T CD4+ y, de esta manera, una polarización de la respuesta inmune a un perfil Th2. Este perfil podría facilitar el cambio de clase de Ig hacia IgE provocando una HGG^{33,34}.

Causas de hipergammaglobulinemia monoclonal

Las GM son un grupo de enfermedades neoplásicas, caracterizadas por la proliferación descontrolada y la acumulación en MO de un clon de CP, acompañada de la hiperproducción de Ig monoclonal. Son más comunes en personas de edad avanzada⁵.

El evento iniciador es la traslocación del gen de la cadena pesada de la Ig. Luego, los clones sufren eventos genéticos adicionales y, junto con un microambiente inmunosupresor en MO, permiten la evolución de una condición precursora a otra condición maligna^{35,36}.

Gammapatía monoclonal de significado incierto

Es un trastorno clonal de CP no maligno, sin daño de órgano terminal. Algunos factores de riesgo de progresión a malignidad son: una mayor concentración del pico del componente monoclonal a línea de base, picos monoclonales de IgM o IgA, mayor proporción de CP en MO, presencia de proteinuria de Bence Jones, elevación de la velocidad de eritrosedimentación^{5,37}.

Los pacientes presentan un pico monoclonal no IgM en sangre < 3 g/dl, concentración de proteína M en orina < 500 mg/día, < 10% CP en biopsia de MO, ausencia de síntomas y daño en órganos dianas. La HGG suele ser principalmente tipo IgG^{37,38}.

La medición de proteínas es útil para el seguimiento de los pacientes, ya que un pico monoclonal inferior a 1,5 g/dl, de tipo IgG y con un nivel normal de CLLM presenta menor riesgo de transformación en mieloma múltiple (MM)³⁸.

Mieloma múltiple

Es el tumor de CP más frecuente como consecuencia de varios sucesos oncogénicos de la serie B. Además, la IL-6 desempeña un papel primordial en la proliferación de LB e inhibe su muerte por apoptosis³⁸.

Esta patología suele ser precedida por condiciones precursoras como gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) o MM latente, las cuales son asintomáticas. Algunos factores de riesgo de progresión son: proteína M elevada, isotipo no IgG, radio CLLM anormal, CP en MO >20%³⁵.

Se define por infiltración de MO con CP >10% y presencia de disfunción orgánica⁵. Esta se puede evidenciarse por hipercalemia (>11 mg/dl), insuficiencia renal (creatinina sérica >2 mg/dl), anemia (hb <10 g/dl) o lesiones óseas líticas³⁵.

La HGG monoclonal tiene gran importancia en el Dco. debido a que forma parte de los criterios diagnósticos de otras GM y permite diferenciarlo de estas⁵. Además, la determinación de la proteína M se usa para el seguimiento del MM, ya que uno de los criterios de remisión completa es una inmunofijación negativa en suero y orina³⁵.

Macroglobulinemia de Waldenstrom

Es una neoplasia de células B causada por una hiperactivación maligna de un LB posgerminal que se transforma antes del cambio de isotipo. Por esta razón, se caracteriza por infiltración de la MO >10 % e HGG monoclonal de tipo IgM³⁹.

Dentro del sistema internacional de estadificación para macroglobulinemia de Waldenstrom (MGW), aquellos parámetros que se asocian con mayor riesgo son: edad >65 años, hemoglobina <11.5 g/dl, plaquetas <100.000/ul, b2 microglobulina >3 mg/dl, concentración de IgM >7 g/dl³⁹.

La HGG monoclonal por IgM conduce a un aumento de la resistencia vascular, la viscosidad sanguínea y posible aparición de autoinmunidad³⁹.

Amiloidosis de cadenas livianas

Es un trastorno de clones de CP que producen Ig monoclonal, que sufre mal plegamiento y agregación formando el depósito amiloide⁵.

En la MO de estos pacientes, se detecta un porcentaje bajo de CP y existe una restricción clonal de CLLM, principalmente tipo lambda³⁸.

En el Pxé de suero, hay ausencia de pico monoclonal debido que las CLLM son filtradas por riñón, pero se encuentran en la orina como una proteinuria de Bence Jones, que puede provocar toxicidad renal. Por lo tanto, para el Dco. de amiloidosis, se realiza inmunofijación en suero y orina (donde se encuentran fisiológicamente concentradas) para caracterizar la paraproteína y, además, medición de CLLM en suero por nefelometría. Para seguimiento de estos pacientes, se miden CLLM en suero^{5,38,40}.

Conclusiones

La detección y caracterización de la HGG es importante para detectar la causa que lleva a la hiperactivación de LB y aumento de la producción de Igs. De esta manera, permite contribuir al Dco. del paciente, diferenciar entre estados clínicos patológicos y, por lo tanto, determinar el tratamiento más adecuado. En el caso de la HGG policlonal (causas reactivas, autoinmunes y errores innatos de la inmunidad),

el Pxé y posterior cuantificación por nefelometría o quimio-luminiscencia son suficientes para reconocer y caracterizarla, mientras que, en la HGG monoclonal, se requieren estudios complementarios como inmunoelectroforesis o inmunofijación para caracterizar la paraproteína. Además, en patologías como HAI y las distintas GM, la HGG ya está dentro de los criterios de clasificación/diagnóstico, por lo tanto, es indispensable la medición de Igs. Asimismo, en HAI, SSj, GMSI y MGW, una mayor HGG permite establecer un peor pronóstico. Por último, en GM, tales como GMSI y MM, la HGG es útil para el seguimiento de los pacientes; en el MM, se mide la proteína M por inmunofijación y, en la amiloidosis de CLLM, se mide CLLM en suero por nefelometría.

De este modo, se destaca el papel fundamental del laboratorio, ya que, mediante una gran variedad de técnicas de laboratorio, tales como Pxé, inmunofijación, nefelometría y turbidimetría, complementarias entre sí, se pueden caracterizar las diferentes situaciones clínico-patológicas, las cuales son ampliamente utilizadas en los laboratorios actualmente. Sin embargo, se deben conocer las ventajas y desventajas de estas técnicas para poder elegir la más adecuada según la clínica y el Pxé del paciente y poder llegar a un Dco., pronóstico y monitoreo adecuados del mismo.

Conflictos de interés

Los autores declaran no poseer conflictos de interés.

Referencias bibliográficas

1. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Inmunología Celular y Molecular. 8va edición. Barcelona, España: Elsevier; 2015.
2. Fainboim L, Gelfner J. Introducción a la Inmunología Humana. 6ta edición. Buenos Aires: panamericana; 2011.
3. Henry JB. El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico. 20ª Edición. Madrid: Marban; 2004.
4. Beuvon C, Martin M, Baillou C, Roblot P, Puyade M. Etiologies of Polyclonal Hypergammaglobulinemia: A scoping review. Eur J Intern Med. 2021;(90):119-21. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2021.05.023>
5. Faria RMD, Silva ROP. Gamopatias monoclonais: critérios diagnósticos e diagnósticos diferenciais. Rev Bras Hematol E Hemoter 2007;29(1): 17-22. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-84842007000100005>
6. Boban MJ, de Elías R, Kiener O, Kiener G, Jarmi V, Barzón S. Evaluación de la zona gamma del proteinograma por electroforesis: correspondencia clínico-patológica. Acta Bioquím Clín Latinoam 2017; 51(2): 213-20.
7. Rodríguez Zapata M, Sánchez Martínez L, Ruano Soriano E, Montes Ramírez ML. Protocolo de indicaciones e interpretación clínica de la inmunoelectroforesis de las inmunoglobulinas en la práctica clínica. Med - Programa Form Médica Contin Acreditada 2000;8(25):1303-06. [http://dx.doi.org/10.1016/S0304-5412\(00\)70252-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0304-5412(00)70252-6)
8. Lo MS, Zurakowski D, Son MBF, Sundel RP. Hypergammaglobulinemia in the pediatric population as a marker for underlying autoimmune disease: a retrospective cohort study. Pediatr Rheumatol 2013;11(42): 1-8. <http://dx.doi.org/10.1186/1546-0096-11-42>
9. Paniagua MJP, Pérez RDB. El sistema inmune del recién nacido. Alergia, asma e inmunología pediátricas 2003;12(2):63-68.
10. Torres LS, Gamboa DÁ. Inmunología Perinatal. FEMINA 2014; 42(4): 185-192.
11. Bastias C, Sidgman F, Rodríguez C. Laboratorio de Inmunología en la práctica clínica. Rev. Med. Clin. Condes 2015;26(6):764-75. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rmcl.2015.11.005>

12. Pérez Surribas D, Cárdenas Fernández MC, Zapico Muñiz D. Recomendaciones sobre la separación electroforética de las proteínas plasmáticas en suero. Documentos de la SEQC 2015; 91-104.
13. González de Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3ª edición. Barcelona: Elsevier Masson; 2010.
14. Parslow TG, Stites DP, Terr AI, Imboden JB. Inmunología básica y clínica. 10ª Edición. México, D.F: El manual moderno; 2002.
15. Lomonte B, Bonilla C. Castro, E. Niveles de Inmunoglobulinas Séricas (IgG, IgA e IgM) en adultos jóvenes sanos, por el método de inmunodifusión radial. Rev. costarric. cienc. Méd 1985 ;6(4):183-190.
16. Hunziker L, Recher M, Macpherson AJ, Ciurea A, Freigang S, Hengartner H, et al. Hypergammaglobulinemia and autoantibody induction mechanisms in viral infections. Nat Immunol 2003;4(4):343-9, <http://dx.doi.org/10.1038/ni911>
17. Bascones-Martínez A, Pousa-Castro X. Herpesvirus. Av Odontostomatol 2011; 27(1):11-24.
18. Drouet E, Chapuis-Cellier C, Bosshard S, Verniol C, Niveleau A, Touraine JL, et al. Oligo-monoclonal immunoglobulins frequently develop during concurrent cytomegalovirus (CMV) and Epstein-Barr virus (EBV) infections in patients after renal transplantation. Clin Expl Immunol 2001;118(3):465-72, <http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2249.1999.01084.x>
19. Hantz S, Alain S. Infecciones por el virus del herpes simple. EMC Pediatría 2018;53(2):1-13. DOI: 10.1016/S1245-1789(18)89722-0
20. Tinoco Racero I, Caro Gómez N, Rodríguez Leal C, López Tinoco E. Infecciones por el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Medicina 2014;11(50):2954-64, [http://dx.doi.org/10.1016/S0304-5412\(14\)70722-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0304-5412(14)70722-X)
21. Ehrenstein MR, Isenberg DA. Hypergammaglobulinaemia and autoimmune rheumatic diseases. Ann RheumDis 1992;51(11):1185-7, <http://dx.doi.org/10.1136/ard.51.11.1185>
22. Liberal R, Miel-Vergani G, Vergani D. Autoimmune hepatitis: From mechanism so therapy. Rev Clínica Esp 2016;216(7):372-83. En prensa. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2016.04.003>
23. Orts Costa JA, Zúñiga Cabrera A, Alarcón Torres I. Hepatitis autoinmune. AnMed Interna 2004;21(7):34-48.
24. Benítez-Rodríguez B, Rodríguez-Sicilia MJ, Vázquez-Morón JM, Pallarés-Manrique H, Ramos-Lora M. Hepatitis Autoinmune: etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento. RAPD ONLINE 2011;32 (2): 86-93.
25. Nocturne G. Actualité dans le syndrome de Sjögren primitif : aspects cliniques et thérapeutiques. RevMédecine Interne 2019;40(7):433-9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2019.03.329>
26. M. Ramos-Casals, M. García-Carrasco, R. Cervera, J. Fonta, M. Ingelmo. Significado clínico de las alteraciones analíticas en el síndrome de Sjögren. Revista Española de Reumatología 2002;29(7):343-55.
27. Mesa JFC, López AEL, Torres JC. Lupus eritematoso sistémico en actividad y cociente albúmina/globulina invertido, ¿hallazgo propio de la enfermedad? RCuR 2020; 22(Supl 1): e853
28. Mok MY. The immunological basis of B-cell therapy in systemic lupus erythematosus. Int J RheumDis 2010;13(1):3-11, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1756-185X.2009.01458.x>.
29. Zamora G, Victoria M. Inmunodeficiencias en la infancia. Rev Cubana Pediatr [Internet] 2003 [citado 2024 Ene 09]; 75(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312003000400007&lng=es.
30. Jesus AA, Duarte AJ, Oliveira JB. Autoimmunity in Hyper-IgM Syndrome. J Clin Immunol 2008;28(S1):62-6, <http://dx.doi.org/10.1007/s10875-008-9171-x>
31. Zhao, EJ, Cheng, CV, Mattman, A, Chen, LY. Polyclonal hypergammaglobulinemia: assessment, clinical interpretation, and management. The Lancet Haematology 2021;8(5):e365-e375, [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(23\)00223-1](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00223-1)
32. França TT, Barreiros LA, al-Ramadi BK, Ochs HD, Cabral-Marques O, Condino-Neto A. CD40 ligand deficiency: treatment strategies and novel therapeutic perspectives. Expert Rev Clin Immunol 2019;15(5):529-40, <http://dx.doi.org/10.1080/1744666X.2019.1573674>.
33. Guisado Vasco P, Fraile Rodríguez G, Arechaga Uriarte S. Síndrome de hiper gammaglobulinemia IgE con infecciones recurrentes: patogénesis, diagnóstico y aproximación terapéutica. Rev Clínica Esp 2011;211(10):520-6, <http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2011.04.009>
34. Tagle C MT, Melys G A, Castillo M A, Norambuena R X, Quezada L A. Síndrome Hiper IgE: a propósito de tres casos clínicos. RevChil Pediatría 2014;85(3):328-336.
35. van de Donk NWCJ, Pawlyn C, Yong KL. Multiple myeloma. The Lancet 2021;397:410-427, <http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062014000300009>
36. Ho M, Patel A, Goh CY, Moscovin M, Zhang L, Bianchi G. Changing paradigms in diagnosis and treatment of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering multiple myeloma (SMM). Leukemia 2020;34(12):3111-3125, <http://dx.doi.org/10.1038/s41375-020-01051-x>
37. Amaador K, Peeters H, Minnema MC, Nguyen TQ, Dendooven A, Vos JMI, et al. Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS): histopathologic classification, diagnostic workup, and therapeutic options. Neth J Med 2019;77(07): 243-254.
38. Charlot-Lambrech I, Salmon JH, Gagneux-Lemoussu L, Brochot P, Eschard JP. Mieloma múltiple. EMC - AparLocomot 2012;45(1):1-13, [http://dx.doi.org/10.1016/S1286-935X\(12\)60820-X](http://dx.doi.org/10.1016/S1286-935X(12)60820-X)
39. Gertz MA. Waldenström macroglobulinemia: 2023 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol 2023; 98(2):348-358, <http://dx.doi.org/10.1002/ajh.26796>.
40. Yadav P, Leung N, Sanders PW, Cockwell P. The use of immunoglobulin light chain assays in the diagnosis of paraprotein-related kidney disease. Kidney Int 2015;87(4):692-7, <http://dx.doi.org/10.1038/ki.2014.333>



Esta obra está bajo la licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional - Permite compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear, a partir del material, otra obra) siempre que: se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra), no sean utilizados para fines comerciales y que se respeten los mismos términos de la licencia.

Fuente: ByPC sep-dic 2025; 89(3):52-58 // ISSN-e 2684-0359

**Instalaciones con 1821mt² dispuestos para investigación,
docencia y atención al paciente**



15 boxes de extracción y 2 amplias salas de espera



**Laboratorio dedicados a 13 especialidades bioquímicas y
médicas equipados con tecnología de punta**



**Promoción y subsidio de investigación biomédica especializada
en el campo de la oncología**



fpm

fundación
para el progreso
de la medicina

**Ciclos de conferencias y convenios de colaboración científica
con instituciones públicas y privadas**



+20 años de experiencia



BIOCON S.A.
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



CENTRO DE ATENCIÓN ONLINE
EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES



3512430482

CASA CENTRAL CÓRDOBA
SAN JOSÉ DE CALASANZ 258



3513080115

CASA CENTRAL JESÚS MARÍA (CBA)
SARMIENTO 152





Compromiso con la excelencia

Nuestro Centro de Provisión y Gestionado posee la más completa línea de insumos y equipos que exige el profesional bioquímico. Precios inmejorables. Garantía de compra. Entrega a domicilio. Planes de pago con financiación directa, bancaria o a través de tarjetas de crédito. Atención personalizada.



PROVEEDURÍA ABC

Coronel Olmedo 154
5000 Córdoba - Argentina

PEDIDOS: 0351-4257077

proveeduriaabc@fibertel.com.ar



BIOCON S.A.
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
www.biocon.com.ar

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN



**Potencia tu laboratorio con Biocon:
calidad, rapidez y precisión trabajando juntos para sus pacientes.**

📞 3513080115 CASA CENTRAL JESÚS MARÍA CÓRDOBA

📞 3512430482 CASA CENTRAL CÓRDOBA

bioconconsultas@gmail.com

**Importantes DESCUENTOS en material de vidrio chino.
Consúltenos precio por unidad y cantidad.**

**Somos representantes
BIOPUR.
Consulte precios!**

**Presentamos
nuestra línea propia
de portaobjetos
y cubreobjetos.**



Catamarca 279 - B° Centro
(0351) 4242067 | laboratorio@puraquimica.com.ar
www.puraquimica.com.ar

**PURA
QUÍMICA**
del Grupo Todo Droga



Laboratorios Gornitz S.A.

Desde 1948.

**Una historia de servicio,
un futuro comprometido
con su historia.**



Catamarca 1328

Villa María - Córdoba

0800 888 5959

laboratorios@gornitz.com

www.gornitz.com

**Pagá, transferí
y consultá**
desde tu celular



Descargá nuestra App

